

Instrucciones para la Preparación de la Colonoscopia:

CRÍTICO: Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un colon limpio.

Si el colon no está completamente limpio, es posible que no podamos realizar un examen adecuado.

COMPRAR:

- **1 botella de 8.3 oz** (un total de 14 porciones) de MiraLAX® (o una marca genérica como ClearLax®)
- Gatorade® - 64 oz (NADA ROJO O MORADO) - Bebidas sin azúcar (G2®, Pedialyte®, Powerade Zero®, Propel® o agua) también son opciones. Mucha cantidad de líquidos claros para beber.
- 4 tabletas de bisacodilo (como Dulcolax®)

7 Días ANTES del Procedi- miento

Los pacientes que toman Ozempic®, Semaglutida, Mounjaro®, Wegovy®, Rybelsus®, Trulicity®, Victoza® u otros medicamentos genéricos similares para la diabetes o la reducción de peso deben **SUSPENDER** su uso al menos 7 días antes de su procedimiento. Esto debe hacerse bajo la dirección de su médico prescriptor. Para su seguridad, su procedimiento será reprogramado si se toman estos medicamentos dentro de los 7 días previos a su procedimiento.

AVISO: NUESTRA OFICINA PUEDE LLAMAR EL DÍA ANTERIOR PARA AJUSTAR SU HORA DE LLEGADA A MEDIDA QUE FINALIZAMOS EL HORARIO DEL CENTRO.

El Día ANTES de su Procedi- miento:

- Mezcle 7 tapones de MiraLAX en cada porción de 32 oz de Gatorade y refrigere.
- **SUSPENDA** todos los alimentos sólidos y suplementos de fibra.
- **NO CONSUMA ALIMENTOS SÓLIDOS**, productos lácteos ni productos de fibra, como Metamucil®, hasta después de su examen.
- **Comenzando con un desayuno de líquidos claros**, continúe bebiendo al menos 8 vasos (64 oz) de líquidos claros durante todo el día y la noche. Los líquidos claros incluyen: agua, bebidas deportivas, café negro, té, cualquier refresco (claro u oscuro), caldo, gelatina, paletas heladas y jugo sin pulpa. **NADA ROJO O MORADO.**
- **A las 4:00pm**, tome las 4 tabletas laxantes de bisacodilo proporcionadas.
- **A las 5:30pm**, comience a beber 32 oz de la solución total de MiraLAX/Gatorade. Beba aproximadamente 8 oz cada 10-15 minutos hasta terminar las 32 oz. Agite o revuelva la preparación antes de cada dosis.
- Continúe bebiendo líquidos claros durante la noche.
- Una pomada calmante (Desitin®, Vaselina®) aplicada en el área anal puede prevenir molestias y daños en la piel.

Día del Procedi- miento:

- **4 horas antes de su llegada**, beba la tercera porción de Gatorade/MiraLAX durante 2 horas.
- **NO BEBA NADA por vía oral durante las 2 horas previas a su procedimiento;** esto incluye agua, mentas o chicle. Su estómago debe estar vacío para que podamos administrar la anestesia de manera segura. Lea el reverso de esta hoja para obtener información sobre cómo tomar sus medicamentos regulares.
- Las evacuaciones intestinales deben parecerse a agua clara de color amarillo/verde 2 horas antes de su procedimiento. **Si no está evacuando heces claras 2 horas antes de su llegada, por favor llame a nuestras enfermeras al 801-619-1115.**

ESTE ES UN PROCEDIMIENTO CON SEDANTE. UN CONDUCTOR RESPONSABLE DEBE PERMANECER EN LA INSTALACIÓN DURANTE TODA SU CITA. (90-120 minutos en total). NO HAY EXCEPCIONES.

Find Additional Information and Instructions on Our Website

www.GranitePeaksGI.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta al 801-619-1115.

¿Está listo tu intestino?

Todavía no



Semi-Sólido
Oscuro



Líquido Algunas
Heces



Color más claro,
partículas presentes

Por poco



Líquido con
partículas
presentes

¡PREPARADO!!



Claro, puedo ver el
fondo del inodoro

MEDICINAS

- **Excepto según se indique a continuación, toma tus medicamentos recetados regularmente con pequeños sorbos de agua al menos dos (2) horas antes de llegar.** Lee a continuación para obtener información sobre anticoagulantes o medicamentos para diabéticos/pérdida de peso.

Diabéticos - INSULINA o MEDICAMENTOS ORALES

- **Por favor, contacta a tu médico recetante para el cuidado diabético si tienes alguna pregunta sobre la dosificación de tus medicamentos orales o de insulina.**
- **No tomes medicamentos orales para la diabetes o insulina el día de tu procedimiento.**
- Prueba tu nivel de azúcar en la sangre antes de venir para tu procedimiento y trae el resultado contigo.

PACIENTES DIABÉTICOS/ PÉRDIDA DE PESO - Semaglutida, Agonistas del Receptor GLP-1

- **Si toma alguno de estos medicamentos para la diabetes o pérdida de peso, hable con su médico recetante para obtener instrucciones sobre cómo **DETENER de manera segura el medicamento al menos 7 días antes de su procedimiento.****
- **Ejemplos:** Ozempic®, Rybelsus®, Mounjaro®, Wegovy®, Trulicity®, Victoza® o medicamentos similares compuestos o genéricos.
- Monitoree sus niveles de azúcar en la sangre mientras esté fuera del medicamento. Ajuste la insulina en consecuencia.

ANTICOAGU- LANTES

- Si está tomando anticoagulantes recetados, llame al médico recetante y pregunte si puede dejar de tomar el medicamento durante el tiempo requerido antes de su procedimiento
- Puede continuar tomando ibuprofeno, aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios hasta el día anterior a su procedimiento. **NO** los tome el día DE su procedimiento.

Traer contigo

- **Deje objetos de valor y teléfonos/dispositivos en casa o con su conductor.**
- **Identificación con foto y tarjeta de seguro.**
- **Su inhalador, si usa uno.**
- **Diabéticos, traigan su lectura de azúcar en la sangre de la mañana y su insulina, si la usan.**
- **Lista de todos los medicamentos,** vitaminas y suplementos que está tomando (incluya la dosis y la última fecha y hora en que se tomó cada medicamento antes de su llegada)
- Use una camisa de manga corta.